




## Priprema za ezofagogastroduodenoskopiju



- ✓ Prije pretrage ne smijete jesti najmanje 6 sati.
- ✓ Prazan želudac nužan je kako bi se mogao napraviti nesmetani pregled.
- ✓ Važno je da svom liječniku unaprijed kažete sve lijekove i pripravke (i one biljne) koje uzimate.
- ✓ Važno je isto tako da liječniku kažete sve bolesti od kojih bolujete ili ste bolovali.
- ✓ Ako znate da ste na nešto alergični, važno da unaprijed obavijestite liječnika.
- ✓ Pretraga može izazvati laganu nelagodu, koja se može bitno umanjiti dobrom pripremom i razgovorom s liječnikom, jer ljudi u pravilu misle da je pretraga strašnija no što to u stvarnosti jest.
- ✓ Prije pretrage skida se zubna proteza (ukoliko je pacijent ima).
- ✓ Prije pretrage se uglavnom daje lokalni anestetik u vidu Lidokain spreja (ukoliko pacijent nije alergičan)
- ✓ Može se dati i blaži sedativni lijek, koji će tjeskobnu osobu opustiti i olakšati pretragu, iako to najčešće nije potrebno.
- ✓ Pretraga se radi na način da bolesnik legne na lijevi bok. Instrument se polako uvodi kroz usta u jednjak, želudac i dvanaesnik. Instrument ne smeta pri disanju i pacijent može disati bilo na nos, bilo na usta.
- ✓ Većina bolesnika nema pri pretrazi doživljaj značajnije nelagode, osobito kada slijedite upute osoblja koje vodi pretragu.
- ✓ Nakon pretrage može zaostati blagi podražaj u ždrijelu, ili nadutost u trbuhu.
- ✓ Nakon odlaska možete normalno jesti kada popusti osjećaj utrnutosti u grlu, što je obično u roku pola do sat vremena.
- ✓ Ako ste dobili neki lijek za ublažavanje straha i nelagode ili za opuštanje ne smijete upravljati vozilom još neko vrijeme, sve dok traje njegovo djelovanje. Kako je to najmanje nekoliko sati neka Vas neko drugi doveze na pretragu i iza toga odveze kući.