

Priprema za ERCP

1 tjedan prije pretrage

- ✓ Ako uzimate inzulin, lijekove za dijabetes, antiagregatnu (Aspirin, Andol, Plavix...) ili antikoagulantnu terapiju (Martefarin, Xarelto, Eliquis, Pradaxa...) slijedite upute nadležnog liječnika u svezi uzimanja istih.
- ✓ Za većinu ovakvih zahvata morate obaviti pregled u anesteziološkoj ambulanti.



Što možete očekivati za vrijeme pretrage

- ✓ Od anesteziološkog tima ćete dobiti sedativ (Propofol), također tim će biti prisutan uz Vas cijelo vrijeme procedure uz nadgledanje vitalnih parametara.
- ✓ Za vrijeme pretrage ležite na trbuhu.

Nakon pretrage

- ✓ Ukoliko nakon pretrage idete kući obavezno se pobrinite da imate u pratnji odraslu osobu koja će Vas odvesti kući.
- ✓ Nakon anestezije ostajete u bolnici pod nadzorom najmanje 2 sata.
- ✓ Zbog anestezije nećete biti u stanju upravljati vozilima sljedeća 24 sata.

Na dan pretrage

- ✓ Trebali biste postiti najmanje osam sati (po mogućnosti preko noći) prije postupka da biste imali prazan želudac.
- ✓ Ako uzimate inzulin, lijekove za dijabetes, antiagregatnu ili antikoagulantnu terapiju slijedite specifične upute liječnika.
- ✓ Na dan pretrage možete uzeti sve druge lijekove, uključujući antihipertenzive s malim gutljajem vode.
- ✓ Ponesite popis lijekova.

