



## Priprema za biopsiju jetre



- ✓ Biopsija jetre izvodi se kod bolesnika koji je natašte, tj. 6 sati prije postupka ne smije se ništa jesti niti piti.
- ✓ Ukoliko bolesnik uzima određene lijekove treba se posavjetovati s liječnikom koje lijekove i kada smije uzeti.
- ✓ Prije postupka ne bi se smjeli uzimati lijekovi koji dovode do otežanog zgrušavanja krvi i time stvaraju mogućnost krvarenja iz ubodnih mjesta za vrijeme ili nakon punkcije.
- ✓ Ukoliko uzimate ove lijekove trebete se posavjetovati s liječnikom koji će izvoditi zahvat o tome može li se uopće pristupiti zahvatu i ukoliko može, na koji način će te postupiti glede uzimanja lijekova, tj. kada će te ih izostaviti iz terapije prije planirane biopsije.
- ✓ Da bi se izbjegao rizik krvarenja prije biopsije treba napraviti pregled kompletne krvne slike sa određivanjem broja trombocita, te koagulacijskih parametara (PV- INR, APTV). Ovim metodama može se otkriti sklonost krvarenju kod pojedinih osoba ukoliko se to već ranije nije znalo.
- ✓ Nakon zahvata bolesnik miruje u krevetu 2 sata, a tijekom tog vremena na mjesto punkcije postavlja se teret (vrećica s pijeskom ili slično) ili bolesnik leži na desnom boku u svrhu pritiska na krvne žile u punktiranom području čime se također sprječava nastup krvarenja.
- ✓ Nakon toga bolesnik smije ustati iz kreveta, jesti, piti, obavljati nuždu, no tijekom prva 24 sata zabranjena je bilo kakva teža fizička aktivnost.
- ✓ Ukoliko se postupak radi kod ambulantnih bolesnika (koji ne ostaju u bolnici nakon zahvata), kroz prva 24 h s njima treba stalno netko biti.
- ✓ U slučaju bilo kakvih komplikacija (ponovna pojava bolova nakon što su inicijalno prestali ili pojačanje bolova, pojava otekline na mjestu punkcije, slabost, malaksalost, nesvjestica, znojenje, lupanje srca, porast temperature) odmah se javiti doktoru obiteljske medicine ili zvati Hitnu medicinsku pomoć ili se javiti u Hitni prijam bolnice.